

殺菌剤

協友

フェスティバル[®]水和剤

ジメトモルフ 50.0%

種類名/ジメトモルフ水和剤
農林水産省登録/第23692号
毒性/普通物*
有効年限/3年
包装/250g×40

特長

- べと病、疫病に特異的に高い効果を発揮します。
- 優れた予防効果に加え、治療的効果を発揮します。
- 経済性に優れ、コストの削減がはかれます。

適用病害と使用方法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
ばれいしょ	疫病	1000～2000倍	100～300ℓ	収穫14日前 まで	3回	散布
ねぎ	べと病	2000倍		収穫3日前 まで		
はくさい				収穫前日 まで		
キャベツ きゅうり						
トマト ミニトマト	疫病		200～700ℓ	収穫前日 まで	2回	
ほうれんそう	べと病	収穫14日前 まで				
バジル		収穫45日前 まで				
小粒種ぶどう		収穫30日前 まで				
大粒種ぶどう						

使用にあたって

■使用上の注意

- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 本剤は莖葉部からの吸収移行性およびガス化による効果はないので、散布むらのないよう均一に散布してください。
- 本剤は予防効果が主体で治療効果は弱いので散布時期を失することなく処理してください。
- 連続使用は耐性菌出現のおそれがあるので、なるべく連用をさけ、作用性の異なる他の薬剤と組み合わせることで輪番で使用してください。
- 空袋は圃場等に放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。使用後は洗眼してください。

■貯蔵上の注意

- 密封し、直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温な場所に保管してください。