

水稻用一発処理除草剤



AVH-301

M4100

ジエイフレンド®

1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ・400FG NEW

®: JA全農の登録商標

後発のノビエも
長く抑える!

田植同時も、
(1キロ粒剤)
直播水稻も
OK!

ホタルイも
しっかり枯らす!

難防除雑草
に強い!



いざ、問題雑草退治!



アゼナ

クサネム

クログワイ

ウリカワ

イボクサ

しつこいノビエはもちろん、ホタルイ、コナギ、SU抵抗性雑草にもしっかりと効果を發揮!

特
長

- ①後発のノビエの発生を長く抑制します。
- ②難防除雑草(オモダカ、クログワイ)や、SU抵抗性雑草に高い効果を發揮します。
- ③クサネム、イボクサ、タウコギ等の特殊雑草にも優れた効果を示します。
- ④効果の発現が非常に速く、長期間持続します。

適用雑草の範囲及び使用方法

ジェイフレンド 1キロ粒剤

■農林水産省登録 第23844号 ■有効成分(一般名)オキサジクロメホン:0.3% テフリルトリオン:3.0%

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数	使用方法
移植 水稻	水田一年生雑草 マツバハイ、ホタルイ、ヘラオモダカ ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ クログワイ、ヒルムシロ、セリ	移植時	1kg/10a	本剤 1回	田植同時 散布機で施用
		移植直後～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで		オキサジクロメホン剤 2回 テフリルトリオン剤 2回 ピラクロニル剤 2回	湛水散布 又は 無人ヘリコプターによる散布
直播 水稻	水田一年生雑草 マツバハイ、ホタルイ ヘラオモダカ、ミズガヤツリ ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	稻1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫60日前まで			

*毒物及び劇物に該当しないものを指す

ピラクロニル:2.0% ■人畜毒性:普通物*

雑草名	散布適期
ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ	3葉期まで(直播:2葉期まで)
ウリカワ	3葉期まで(直播:1葉期まで)
オモダカ クログワイ	発生前～発生始期まで
ヒルムシロ	発生期まで
セリ	再生前～再生始期まで

ジェイフレンド フロアブル

■農林水産省登録 第23845号 ■有効成分(一般名)オキサジクロメホン:0.57% テフリルトリオン:5.7%

ピラクロニル:3.8% ■人畜毒性:普通物*

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数	使用方法
移植 水稻	水田一年生雑草 マツバハイ、ホタルイ、ヘラオモダカ ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ クログワイ、ヒルムシロ、セリ	移植後5日～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	500ml /10a	本剤 1回	原液湛水散布 又は水口施用
		ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで		オキサジクロメホン剤 2回 テフリルトリオン剤 2回 ピラクロニル剤 2回	
直播 水稻	水田一年生雑草 マツバハイ、ホタルイ ミズガヤツリ、ウリカワ ヒルムシロ、セリ	稻1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで			

ピラクロニル:3.8% ■人畜毒性:普通物*

雑草名	散布適期
ミズガヤツリ	4葉期まで(直播:3葉期まで)
ホタルイ ウリカワ	3葉期まで(直播:2葉期まで)
ヘラオモダカ	3葉期まで
オモダカ クログワイ	発生前～発生始期まで
ヒルムシロ	発生期まで
セリ	再生前～再生始期まで

ジェイフレンド ジャンボ

■農林水産省登録 第23924号 ■有効成分(一般名)オキサジクロメホン:0.75% テフリルトリオン:7.5%

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数	使用方法
移植 水稻	水田一年生雑草 マツバハイ、ホタルイ、ヘラオモダカ ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ クログワイ、ヒルムシロ、セリ	移植後5日～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 /10a	本剤 1回	水田に小包装 (パック) のまま 投げ入れる
		ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで		オキサジクロメホン剤 2回 テフリルトリオン剤 2回 ピラクロニル剤 2回	
直播 水稻	水田一年生雑草 マツバハイ、ホタルイ ミズガヤツリ、ウリカワ ヒルムシロ、セリ	稻1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫60日前まで			

ピラクロニル:5.0% ■人畜毒性:普通物*

雑草名	散布適期
ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ	3葉期まで
ミズアオイ	2葉期まで
オモダカ クログワイ	発生前～発生始期まで
ヒルムシロ	発生期まで
セリ	再生前～再生始期まで

ジェイフレンド 400FG

■農林水産省登録 第24392号 ■有効成分(一般名)オキサジクロメホン:0.75% テフリルトリオン:7.5%

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数	使用方法
移植 水稻	一年生雑草 マツバハイ、ホタルイ、ヘラオモダカ ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ クログワイ、ヒルムシロ、セリ	移植後5日～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	400g /10a	本剤 1回	湛水散布、 湛水周縁散布 又は 無人航空機による散布
		ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで		オキサジクロメホン剤 2回 テフリルトリオン剤 2回 ピラクロニル剤 2回	
直播 水稻	一年生雑草 マツバハイ、ホタルイ ミズガヤツリ、ウリカワ ヒルムシロ、セリ	稻1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫60日前まで			

ピラクロニル:5.0% ■人畜毒性:普通物*

雑草名	散布適期
ヘラオモダカ ミズガヤツリ ホタルイ ウリカワ	3葉期まで
ミズアオイ	2葉期まで
オモダカ クログワイ	発生前～発生始期まで
ヒルムシロ	発生期まで
セリ	再生前～再生始期まで

使用上の注意事項(一部抜粋)

4製剤に共通する注意事項

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期まで(ただし、直播水稻は2.5葉期まで)に時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は育生段階によって効果に遅れが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。
- 砂質土壤の水田および漏水田(漏水量2cm/日以上)、軟弱な苗を移植した水田、極端な浅植えをして水田および浮き苗の多い水田では葉害が発生するおそれがあるので使用をさせてください。
- 稻の根が露出する条件では葉害が生じるおそれがあるので注意してください。
- 苗の植え付けが均一になるよう、大きさ、均平度および植え付けはていねいに行ってください。また、未熟有機物を施用している場合は、特にていねいに行ってください。
- 本剤は殺草特性から、いくさ、れんこん、せり、**1キロ粒剤・ジャンボ・FGに共通する注意事項**
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 1キロ粒剤・ジャンボ・FGに共通する注意事項**
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 1キロ粒剤・ジャンボ・FGに共通する注意事項**
- 本剤は殺草特性から、いくさ、れんこん、せり、**1キロ粒剤・ジャンボに共通する注意事項**
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 1キロ粒剤・ジャンボに共通する注意事項**
- 本剤は殺草特性から、いくさ、れんこん、せり、**1キロ粒剤・FGに共通する注意事項**
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 1キロ粒剤・FGに共通する注意事項**
- 本剤は殺草特性から、いくさ、れんこん、せり、**1キロ粒剤に共通する注意事項**
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

- 藻や浮き草が多発している水田では、拡散が不十分となり部分的な薬害や効果不足を生じることがあるので使用をさせてください。
- 水生動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流水しないでください。また、空袋、空容器等は水生動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 無人ヘリコプターによる散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン等の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。

*本資料の記載内容は2023年7月現在の登録内容に基づいています。

★使用前にはラベルをよく読んでください。★ラベルの記載以外には使用しないでください。★本剤は小児の手の届くところには置かないでください。★空袋・空容器は圃場などに放置せず、適切に処理してください。



JAグループ
農協 | 全農 | 経済連
全農は登録商標 第4702318号



協友アグリ株式会社
東京都中央区日本橋小網町6-1
<https://www.kyoyu-agri.co.jp>