

水稻除草剤

住化

バサグラン® 粒剤 (ナトリウム塩)

ベンタゾン…………… 11.0%

種類名/ベンタゾン粒剤
農林水産省登録/第16117号(住友化学登録)
毒性/普通物*
有効年限/5年
包装/3kg×8

特 長

- 薬剤処理適期幅が広く、生育期処理での効果が高いため、雑草の発生を見てから処理できます。
- ウリカワ、ホタルイ、ミズガヤツリ、オモダカ等の多年生雑草および一年生の広葉雑草に優れた効果があります。

適用雑草と使用方法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用雑草名	使用時期	10a当り 使用量	総使用回数*	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ クログワイ エゾノサヤヌカグサ シズイ	移植後 15～55日 但し、 収穫60日前まで	3～4kg	本剤 ベンタゾン剤 1回 2回	落水散布 又は ごく浅く 湛水して 散布
直播水稲	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	稲3葉期～ 入水50日後 但し、 収穫60日前まで	3kg		

使用にあたって

■使用上の注意

- 本剤は水の移動に伴う移行性が大きく、一般に水深の浅いほど効果が安定します。
 - ① 使用に当っては落水状態(足跡に水が残っている状態)にして水の出入りを止め、まきむらのないように均一に散布してください。
 - ② 水を落とすことができないところでは漏水のない水田に限り、できるだけ浅水状態(雑草が水面上に出る状態)にしてまきむらのないよう均一に散布してください。
 - ③ 散布後少なくとも3日間(浅水処理は5日間)はそのままの状態を保ち、入水、落水、かけ流しはしないでください。また、散布後7日間は降雨の有無にかかわらず落水しないでください。
 - ④ 処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になるおそれがあるので、晴天の持続する時を選んで使用してください。
 - ⑤ 深水にすると効果が劣るので注意してください。
- イネ科雑草には効果が劣るので、田植前後の土壌処理除草剤で一年生雑草を防除した後、多年生水田雑草および一年生広葉雑草の防除を目的として使用してください。
- 砂質土および漏水の激しい水田では使用しないでください。(減水深2cm/日以上)
- 本剤は生育期に入った雑草に効果がありますが、雑草、特に、多年生雑草は生育段階によって効果にブレが出るので必ず適期に散布してください。ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカでは発生盛期から増殖中期、オモダカでは発生盛期から発生揃期まで、クログワイでは草丈15cm以下、エゾノサヤヌカグサでは1～4葉期、シズイでは草丈10～30cmが本剤散布の適期です。

- クログワイ防除は、必要に応じて有効な前処理剤との組み合わせで使用してください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■水産動植物への注意

- 水産動植物（藻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。

■安全使用上の注意

- 誤食などのないように注意してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

■貯蔵上の注意

- 密封し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2023年1月17日現在の登録内容に基づいています。