

BT水和剤

バイオマックス[®]DF

りんごをはじめ、**果樹類**のハマキムシ類、
シャクトリムシ類の防除はバイオマックスDFで!!
収穫前日まで使用できます。

殺虫剤



果樹類のハマキムシ類・シャクトリムシ類防除に **バイオマックスDF** (BT生菌剤)

有効成分：パチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素………10.0%

特長

- 選択性の高い生物農薬
- 新JAS法に基づく有機農産物の生産に使用可能

- 高活性、速効的なクルスターキ系生菌剤
- 殺虫性タンパク質の効果を生芽胞が増強

- 製剤は粉立ちの少ないドライフロアブル
- 計量しやすく薬液調製が簡便

適用害虫と使用方法 (適用表より抜粋)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BTを含む農薬の総使用回数
果樹類 (りんごを除く)	ハマキムシ類	2,000～3,000倍	発生初期 但し、 収穫前日まで	—	散布	—
	シャクトリムシ類 ケムシ類	2,000倍				
りんご	ハマキムシ類 ケムシ類	2,000～3,000倍				
	シャクトリムシ類	2,000～4,000倍				





バイオマックスDFは樹木類にも登録があります。

2019年8月現在の登録内容

上手な使い方

バイオマックスDFは食毒効果に優れており、果樹類のハマキムシ類及びシャクトリムシ類の防除に有効です。特にりんごでは開花期のミダレカクモンハマキ防除に好適です。また、天敵・有用昆虫類に対する影響もほとんどなく、性フェロモン体系など天敵・有用昆虫類の活動を保全した栽培体系にも使用可能です。

試験例



⚠️〈使用上の注意事項(抜粋)〉詳細はラベルをご参照ください。

- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 使用に当たっては、展着剤を加用することが望ましい。
- アルカリ性の強い石灰硫黄合剤、ボルドー液などの農薬及びアルカリ性の強い葉面施肥の肥料などとの混用はさけてください。
- 若令幼虫に有効なので、若令幼虫期に時期を失せず散布してください。
- 蚕に対する毒性があるので、養蚕主産県その他主要養蚕地帯及び養蚕農家、共同飼育場などの周辺では施用しないでください。また、これら以外の場所でも付近に養蚕場がある場合は、飛散してかからないよう風向等に十分注意して散布してください。

- ださい。なお、本剤の使用に当たっては、散布地域の使用規制に従ってください。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 吸湿すると固化したり、効果が低下したりすることがあるので、貯蔵に当たっては湿気に注意し、特に使用残りの薬剤は密封して乾燥した冷暗所に貯蔵してください。
- 空中散布には使用しないでください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に被害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所には置かないでください。● 空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

2023年10月作成 東宣 P3202310005