

新規・水稲用一発処理除草剤

# ガツンZ<sup>®</sup>

1キロ粒剤/ジャンボ/フロアブル/200FG

2成分で、  
ガツンと除草！

枯殺力で定評のある成分を、ダブル配合！

SU抵抗性のホタルイやオモダカも！

イボクサなどの特殊雑草も！

さらに4剤型で、直播水稲・田植同時処理・

水口施用・ドローン散布に対応！



- 2成分で幅広いスペクトラムを有する一発処理除草剤です。
- 多年生難防除雑草やSU抵抗性ホタルイ・オモダカに優れた効果を示します。
- イボクサ等特殊雑草へも効果を示します。

適用雑草の範囲及び使用方法

\*毒物及び劇物に該当しないものを指している通称

ガントZ 1キロ粒剤

■有効成分(一般名) テフリルトリオン…2.0% プロピルスルフロ…0.90%

| 作物名  | 適用雑草名  | 使用時期                          | 使用量      | 総使用回数 | 使用方法                          |
|------|--|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|
| 移植水稲 | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植時                           | 1kg /10a | 1回    | 田植同時<br>散布機で施用                |
|      |  | 移植直後～ノビエ3.5葉期<br>ただし、収穫60日前まで |          |       | 本人畜毒性・普通物*                    |
| 直播水稲 | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ   | 稲1葉期～ノビエ3葉期<br>ただし、収穫60日前まで   | 1kg /10a | 2回    | 本人畜毒性・普通物*<br>農林水産省登録 第24492号 |

| 雑草名              | 散布適期       |
|------------------|------------|
| ホタルイ             | 4葉期まで      |
| ウリカワ             | 3葉期まで      |
| ヘラオモダカ           | 2葉期まで      |
| ミズガヤツリ           | 20cmまで     |
| ヒルムシロ            | 発生期まで      |
| セリ               | 再生期まで      |
| オモダカ             | 発生始期まで     |
| クログワイ            | 発生前～発生始期まで |
| コウキヤガラ           | 発生始期まで     |
| アオミドロ・藻類による表層はく離 | 発生前        |

ガントZ ジャンボ

■有効成分(一般名) テフリルトリオン…10.0% プロピルスルフロ…4.5%

| 作物名  | 適用雑草名  | 使用時期                           | 使用量                                | 総使用回数 | 使用方法                                |
|------|--|--------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 移植水稲 | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植後3日～ノビエ3.5葉期<br>ただし、収穫60日前まで | 小包装<br>(パック)<br>10個<br>(200g) /10a | 1回    | 水田に<br>小包装<br>(パック)<br>のまま<br>投げ入れる |
|      |  | 稲1葉期～ノビエ3葉期<br>ただし、収穫60日前まで    |                                    |       | 本人畜毒性・普通物*                          |
| 直播水稲 | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離                          | 稲1葉期～ノビエ3葉期<br>ただし、収穫60日前まで    | 10個 (200g) /10a                    | 2回    | 本人畜毒性・普通物*<br>農林水産省登録 第24493号       |

| 雑草名              | 散布適期       |
|------------------|------------|
| ホタルイ、ウリカワ        | 5葉期まで      |
| ヘラオモダカ           | 2葉期まで      |
| ミズガヤツリ           | 15cmまで     |
| ヒルムシロ            | 発生期まで      |
| セリ               | 再生期まで      |
| オモダカ             | 矢じり葉2葉期まで  |
| クログワイ            | 20cmまで     |
| コウキヤガラ           | 発生前～発生始期まで |
| アオミドロ・藻類による表層はく離 | 発生前        |

ガントZ フロアブル

■有効成分(一般名) テフリルトリオン…3.8% プロピルスルフロ…1.7%

| 作物名  | 適用雑草名  | 使用時期                         | 使用量        | 総使用回数 | 使用方法                                    |
|------|--|------------------------------|------------|-------|---|
| 移植水稲 | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植後3日～ノビエ3葉期<br>ただし、移植後30日まで | 500mℓ /10a | 1回    | 原液混水散布、<br>水口施用<br>又は<br>無人航空機<br>による滴下 |
|      |  | 稲1葉期～ノビエ3葉期<br>ただし、収穫90日前まで  |            |       | 本人畜毒性・普通物*                              |
| 直播水稲 | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離                          | 稲1葉期～ノビエ3葉期<br>ただし、収穫90日前まで  | 500mℓ /10a | 2回    | 本人畜毒性・普通物*<br>農林水産省登録 第24491号           |

| 雑草名              | 散布適期       |
|------------------|------------|
| ホタルイ、ウリカワ        | 3葉期まで      |
| ヘラオモダカ           | 2葉期まで      |
| ミズガヤツリ           | 15cmまで     |
| ヒルムシロ            | 発生期まで      |
| セリ               | 再生期まで      |
| オモダカ、クログワイ       | 発生前～発生始期まで |
| コウキヤガラ           | 発生始期まで     |
| アオミドロ・藻類による表層はく離 | 発生始期まで     |

ガントZ 200FG

■有効成分(一般名) テフリルトリオン…10.0% プロピルスルフロ…4.5%

| 作物名  | 適用雑草名  | 使用時期                           | 使用量       | 総使用回数 | 使用方法                          |
|------|--|--------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|
| 移植水稲 | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植後3日～ノビエ3.5葉期<br>ただし、収穫60日前まで | 200g /10a | 1回    | 本人畜毒性・普通物*                    |
|      |  | 稲1葉期～ノビエ3葉期<br>ただし、収穫60日前まで    |           |       | 本人畜毒性・普通物*<br>農林水産省登録 第24494号 |
| 直播水稲 | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離                          | 稲1葉期～ノビエ3葉期<br>ただし、収穫60日前まで    | 200g /10a | 2回    | 本人畜毒性・普通物*<br>農林水産省登録 第24494号 |

| 雑草名              | 散布適期       |
|------------------|------------|
| ホタルイ、ウリカワ        | 5葉期まで      |
| ヘラオモダカ           | 2葉期まで      |
| ミズガヤツリ           | 15cmまで     |
| ヒルムシロ            | 発生期まで      |
| セリ               | 再生期まで      |
| オモダカ             | 矢じり葉2葉期まで  |
| クログワイ            | 20cmまで     |
| コウキヤガラ           | 発生前～発生始期まで |
| アオミドロ・藻類による表層はく離 | 発生前        |

使用上の注意事項 (一部抜粋)

【4割型に共通する注意事項】

- 多年生雑草は生育段階によって効果がフルが出るので、必ず適期に使用するようご注意ください。また、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く遅い発生ものまで十分効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。
- 本剤散布後、少なくとも3～4日は通常の灌水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平作業及び補え付けは行わないで行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特に注意してください。
- 軟弱苗を移植した水田、極端な浅植えをした水田、極端な深水となった水田及び砂質土で漏水の大きな水田(漏水深2cm/日以上)では、薬害を生じるおそれがあるので使用しないでください。
- 直播水稲栽培では、稲の根が露出する条件下では薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 除草効果が低下するおそれがある大雨の降りが予想される場合には使用を控えてください。
- 本剤は、その殺菌特性から、いぐさ、れんこん、せき、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用の場合は、十分注意してください。
- いぐさ栽培予定水田では使用しないでください。
- 本剤散布後の田面水を他作物に灌水しないでください。
- 薬や浮草が多発している水田では、拡散が不十分となり部分的な薬害や効果不足を生じることがあるので使用を控えてください。

などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にしてください。特に初めて使用する場合は異常気象の場合には、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

【ジャンボ、フロアブル、FGに共通する注意事項】  
● 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。  
● 散布後は水管理に注意してください。

【1キロ粒剤、ジャンボ、FGに共通する注意事項】  
● 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3.5葉期までに時期を失しないよう使用してください。

【1キロ粒剤、フロアブル、FGに共通する注意事項】  
● 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。

【フロアブル、FGに共通する注意事項】  
● 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

● 直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

【ジャンボ、FGに共通する注意事項】  
● 散布に当たっては、水の出入りを止め5～6cmの湛水状態に保ってください。

● 薬や浮草が多発している水田では、拡散が不十分となり部分的な薬害や効果不足を生じることがあるので使用を控えてください。

用をさしてください。

【1キロ粒剤の注意事項】  
● 散布に当たっては、水の出入りを止め湛水状態(3～5cm)で均一に散布してください。

● 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすしてください。

【ジャンボの注意事項】  
● ジャンボは小包装(パック)のまま、10アール当たり10個の割合で水田に投げ入れてください。

● バックに使用しているフィルムは水溶性なので、濡れた手で作業したり、降雨で破袋することがないようにしてください。

● 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意してください。

● 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の処置を受けてください。

● 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすしてください。

● 空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

● 水溶性フィルムは吸湿性があるので、湿気には十分注意し、使い残りの外袋の口を固く閉じて保管してください。また、強く圧加えられると水溶性フィルムが劣化するおそれがあるので下積みにならないようにしてください。

● 直射日光を避け、食品と区別して、子供の手のとどかないなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

【フロアブルの注意事項】  
● 使用前に容器を軽く振ってください。

● 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失しないよう使用してください。

● 原液混水散布に当たっては、水の出入りを止め湛水状態(水深3～5cm)で本剤が水田全面にいきわたるように散布してください。

● 水口施用の場合は、入水時に本剤を水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させ、処理後田面水が通常の湛水状態に達したときに必ず水を止め、田面水があふれ出ないように注意してください。

● 無人航空機による滴下で使用の場合は、飛散しないよう十分に注意してください。

● 無人航空機による散布で使用の場合は、飛散しないよう十分に注意してください。

● 皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落とすしてください。

● 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の処置を受けてください。

★使用前にはラベルをよく読んでください。★ラベルの記載以外には使用しないでください。★本剤は小児の手の届くところには置かないでください。★空袋、空容器は圃場などに放置せず、適切に処理してください。★本資料の記載内容は2023年11月現在の登録内容に基づいています。