

果樹、いちご、花き類の病害防除に

トレノックス®

フロアブル

汚れが少ない。

フロアブルのため、
従来の水和剤よりも
果実が汚れません。

使用適期が長く、 安全。

落花直後から使用でき、
サビ果の発生も少ないため、
生育初期～中期の
病害防除に最適です。

広範な病害に有効。

予防効果が高く、
混発する主要病害を
同時に防除できます。

様々な作物に有効。

果樹以外に
いちご、花き類にも!!

りんごの
灰色かび病に
適用拡大!!

果樹の
病害防除に

トリノックス[®] フロアブル

チウラム水和剤

有効成分：チウラム 40.0%

■人畜毒性：普通物* * 毒物及び劇物に該当しないものを指している通称

適用病害及び使用方法

| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 10a当り 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | チウラムを含む 農薬の総使用回数 |
|---------------------------|--|----------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| りんご | 斑点落葉病 黒星病 黒点病 褐斑病 すす点病 すす斑病 赤星病 炭疽病 輪紋病 灰色かび病 | 500倍 | 200~700ℓ | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| なし | 黒斑病 黒星病 赤星病 心腐れ症 (胸枯病菌) 炭疽病 褐色斑点病 | | | 5回以内 (休眠期は1回以内) | | | |
| もも | 黒星病 灰星病 縮葉病 せん孔細菌病 | | | 収穫7日前まで | 5回以内 | | |
| かき | 落葉病 炭疽病 うどんこ病 | | | 収穫30日前まで | 2回以内 (休眠期は1回以内) | | |
| すもも | ふくろみ病 炭疽病 | | | 収穫14日前まで | 3回以内 | | |
| ネクタリン | 黒星病 灰星病 縮葉病 せん孔細菌病 | | | 収穫30日前まで | 5回以内 | | |
| おうとう | 褐色せん孔病 炭疽病 灰星病 幼果菌核病 | | | 収穫21日前まで | 5回以内 (萌芽後は2回以内) | | |
| あんず | かいよう病 | | | 3回以内 | | | |
| うめ | 黒星病 | | | 2回以内 | | | |
| ぶどう | 晩腐病 べと病 灰色かび病 褐斑病 黒とう病 | | | 1000倍 | 1000倍 | | 収穫60日前まで |
| いちご | 炭疽病 | 500倍 | 100~300ℓ | 育苗期 | 5回以内 | 7回以内(育苗期は5回 以内、生育期は2回以内) | |
| | | | | 生育期 但し収穫開始 21日前まで | 2回以内 | | |
| りんどう | 褐斑病 葉枯病 炭疽病 灰色かび病 | 100~500ℓ | 100~500ℓ | 発病初期 | 6回以内 | 6回以内 | |
| 花き類・ 観葉植物 (りんどうを除く) | 灰色かび病 炭疽病 | | | | | | |

使用上の注意事項



- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。
- 本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけてください。
- 銅剤との近接散布は葉の汚れを生じるので注意してください。
- 蚕に対して毒性があるので、桑葉にかからないように注意して散布してください。
- あんずを使用する場合、果実に汚れを生じるおそれがあるので、落花30日後以降の散布はさけてください。
- ぶどうに使用する場合、幼果期~袋掛けまでの散布は、果房の汚れや果粉溶脱を生じるおそれがあるので十分注意してください。
- シクラメンに使用する場合、花卉に薬害が生じるおそれがあるので、花柄伸長期以降は使用しないでください。
- いちごの開花期以後の散布は、果実の汚れを生じるおそれがあるので十分注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

- 誤飲に注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 水産動物(甲殻類、藻類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 密栓し、直射日光を避け、食品と区別してなるべく低温な場所に保管してください。

本資料の記載内容は2023年10月現在の登録内容に基づいています。

★使用前にはラベルをよく読んでください。★ラベルの記載以外には使用しないでください。★本剤は小児の手の届く所には置かないでください。★空容器は圃場などに放置せず、適切に処理してください。



JAグループ
農協 | 全農 | 経済連
全農は登録商標 第4702318号



協友アグリ株式会社
東京都中央区日本橋小網町6-1
https://www.kyoyu-agri.co.jp

2023年10月作成東宣P1202310003