

殺虫剤

協友

サイアノックス® 水和剤

CYAP 40.0%

種類名/CYAP水和剤
 農林水産省登録/第21806号
 毒性/普通物*
 有効年限/4年
 包装/500g×20、1kg×20

特 長

- 有機リン系殺虫剤です。
- チョウ目害虫および吸汁性害虫であるアブラムシ類などに対し速効的に作用しますが、残効性は長くありません。殺卵効果もあります。

適用害虫と使用方法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
りんご	シンクイムシ類 ハマキムシ類 アブラムシ類 キンモンホソガ クワコナカイガラムシ カメムシ類 オオタバコガ リンゴワタムシ	1000倍	200～700ℓ	収穫14日前まで	1回	散布
もも	シンクイムシ類 ハマキムシ類 アブラムシ類			収穫21日前まで	3回	
ネクタリン	モモハモグリガ カイガラムシ類			2回		
なし (無袋栽培)	クワコナカイガラムシ アブラムシ類			収穫45日前まで	3回	
なし (有袋栽培)	ハマキムシ類 シンクイムシ類			収穫7日前まで		
かき	フジコナカイガラムシ カキノヘタムシガ カメムシ類			収穫45日前まで		
すもも	アブラムシ類 シンクイムシ類			収穫21日前まで		
ぶどう	ブドウスカシバ フタデンヒメヨコバイ ハマキムシ類			収穫14日前まで	2回	
おうとう	ケムシ類			収穫7日前まで		
みかん	コナカイガラムシ類			収穫45日前まで		
マルメロ	シンクイムシ類 アブラムシ類			収穫30日前まで		
ブルーベリー	ドクガ マイマイガ					

使用にあたって

■使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- ぶどうの無袋栽培で使用する場合、果粒に汚れが生じるので、果粒肥大中期以降の散布はさけてください。



●ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。

- ①ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
- ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
- ③関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

■混用・薬害

- 強いアルカリ性薬剤との混用はさけてください。ボルドー液と混用する場合は混合後直ちに散布してください。
- りんごの「旭」およびその近縁品種には薬害の出るおそれがあるので注意してください。

■蚕 毒

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

■水産動植物への注意

- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

■安全使用上の注意

- 誤飲、誤食などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 解毒剤としては、動物実験で硫酸アトロピン製剤およびPAM製剤が有効であると報告されています。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。



●散布の際は農業用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。

- また散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

■貯蔵上の注意

- 密封し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2023年1月17日現在の登録内容に基づいています。