



水稻用一発処理除草剤

# サラブレッド KAI<sup>®</sup>

1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ・400FG<sup>NEW</sup>

®は協友アグリ(株)の登録商標です。

効果も！コストも！  
使って爽KAI!!!

高性能

直播水稻&  
WCS用イネにも  
使えます！

省力性

低コスト



3成分配合

ピラクロニル

オキサジクロメホン

イマゾスルフロン



ノビエ



コナギ



アゼナ



ホタルイ



クログワイ



# 水稻用一発処理除草剤



1キロ粒剤  
フロアブル  
ジャンボ  
400FG



## 特長

### 高 性 能

ノビエを始めSU抵抗性雑草や難防除雑草に優れた効果を示す。

### 省 力 性

各種雑草に長い残効性を持ち、水稻への安全性も高く田植同時処理に適している。\*1キロ粒剤、フロアブル

### 低コスト

お求め易い価格で低成本稻作に貢献する。

## 適用雑草の範囲及び使用方法

### サラブレッドKAI 1キロ粒剤

農林水産省登録 第23119号

■有効成分(一般名) ピラクロニル:2.0% オキサジクロメホン:0.4% イマゾスルフロン:0.9% ■人畜毒性:普通物\*

作物名	適用雑草名	使用時期	10a当り使用量	本剤の使用回数	使用方法	ピラクロニルを含む農薬の総使用回数	オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数	イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	一年生雑草 多年生広葉雑草 アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	1kg	1回	田植同時散布機で施用	2回以内	2回以内	2回以内
		移植直後～ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで			湛水散布又は無人航空機による散布			
直播水稻	一年生雑草 ホタルイ・ミズガヤツリ ワリカラ・セリ	稻1葉期～ノビエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで						

### サラブレッドKAI フロアブル

農林水産省登録 第23118号

■有効成分(一般名) ピラクロニル:3.8% オキサジクロメホン:0.57% イマゾスルフロン:1.7% ■人畜毒性:普通物\*

作物名	適用雑草名	使用時期	10a当り使用量	本剤の使用回数	使用方法	ピラクロニルを含む農薬の総使用回数	オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数	イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ・ホタルイ ミズガヤツリ・ウリカラ ヒルムシロ・セリ・オモダカ クログワイ・コウキヤガラ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	500ml	1回	田植同時散布機で施用	2回以内	2回以内	2回以内
		移植直後～ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで			水口施用			
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ・ホタルイ ミズガヤツリ・ウリカラ セリ	稻1葉期～ノビエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで			原液湛水散布又は無人ヘリコプターによる滴下			

### サラブレッドKAI ジャンボ

農林水産省登録 第23339号

■有効成分(一般名) ピラクロニル:5.0% オキサジクロメホン:0.75% イマゾスルフロン:2.25% ■人畜毒性:普通物\*

作物名	適用雑草名	使用時期	10a当り使用量	本剤の使用回数	使用方法	ピラクロニルを含む農薬の総使用回数	オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数	イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ・ホタルイ ミズガヤツリ・ウリカラ ヒルムシロ・セリ・オモダカ・クログワイ コウキヤガラ	移植直後～ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで						
直播水稻	水田一年生雑草 ホタルイ・ミズガヤツリ ウリカラ・ヒルムシロ セリ	稻1葉期～ノビエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで						

### サラブレッドKAI 400FG

農林水産省登録 第24393号

■有効成分(一般名) ピラクロニル:5.0% オキサジクロメホン:0.75% イマゾスルフロン:2.25% ■人畜毒性:普通物\*

作物名	適用雑草名	使用時期	10a当り使用量	本剤の使用回数	使用方法	ピラクロニルを含む農薬の総使用回数	オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数	イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ・ホタルイ ミズガヤツリ・ウリカラ ヒルムシロ・セリ・オモダカ・クログワイ コウキヤガラ	移植直後～ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで						
直播水稻	一年生雑草 ホタルイ・ミズガヤツリ ウリカラ・ヒルムシロ セリ	稻1葉期～ノビエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで						

## △ 使用上の注意事項(一部抜粋)

### 4製剤に共通する注意事項

- 本剤は雑草の発生から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果が現出するので、必ず適期に散布するように注意してください。
- 浅植、浮き苗が生じないように、代かき、均平作業及び繰り付けはていねいに行ってください。未熟な植物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。
- 直播水稻栽培では、稻の根が露出する条件では薬害が生じるおそれがあるので注意してください。
- 軟弱な苗を移植した水稻、種端の浅植えをした水稻、極端な深水となった水稻及び砂質土で漏水の大きな水稻(漏水量2cm/日以上)では、薬害が発生するおそれがあるので使用しないでください。
- 豪しい降雨が予想される場合には、除草効果が低下するおそれがあるので使用を控えてください。

●いくさ栽培予定の水田では使用しないでください。

- 本剤は、その殺草特性から、いくさん、せりんこん、せり、くわいなどの育生を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。
- 本剤を使用した水田の田面水は、他作物の灌漑に用いてください。
- 本剤の使用に当たっては、用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- シャンボ・FGに共通する注意事項
- 散布に当たっては、水の出入りを止め湛水状態(水深3～5cm)で均一に散布してください。本剤散布後、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流ししないでください。

●通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流ししないでください。

- 藻や浮き草が多発している水田では、拡散が不十分となり部分的な薬害や効果不足を生じることがあるので使用をさせてください。
- 本剤は使用した水田の田面水は、他作物の灌漑に用いてください。
- 散布に当たっては、水の出入りを止め湛水状態(水深3～5cm)で均一に散布してください。本剤散布後、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流ししないでください。
- プロアブルの注意事項
- 使用前に容器を軽く振ってください。
- 散布に当たっては、水の出入りを止め湛水状態(水深3～5cm)で本剤が水田全面にいきわざるように散布してください。本剤散布後、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流ししないでください。

●水田散布の場合には、入水時に本剤を水口に施用し、流入とともに水田全面に拡散され、処理後田面水が通常の湛水状態(湛水深3～5cm)に達したときに必ず水を止め、田面水があふれ出ないよう注意してください。

- 畠に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- シャンボの注意事項
- 本剤は小包装(パック)のまま、10アール当たり10個の割合で水田に投げ入れてください。
- パックに使用しているフルムは水溶性なので、ぬれた手で作業したり、降雨で破袋することがないように注意してください。
- FGの注意事項
- 湛水散布の場合には田面に散布し、また湛水周縁部に帯状に散布してください。

\*毒物及び劇物に該当しないものを指す用語

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

J.A.グループ

農 協 | 全 農 | 経 済 連  
JA農業経済連盟は登録商標 第4702318号



協友アグリ株式会社  
東京都中央区日本橋小網町6-1  
<https://www.kyoyu-agri.co.jp>

2023年10月作成東宣P1202310001