

いもち病／ごま葉枯病 穂枯れごま葉枯病菌 すじ葉枯病菌／変色米カーブラ リア菌 内穎褐変病／もみ枯細菌病 稲こうじ病 の同時防除剤

ノンブラスはフェリムゾンにトリシクラゾールを組み合わせた
いもち病予防・治療効果に優れ、幅広い抗菌スペクトラムを合
わせ持つ稲用殺菌剤です。

NONBLAS

ノンブラス[®] 粉剤 DL

フェリムゾン……2.0% トリシクラゾール……0.5%

特長

- ① いもち病やごま葉枯病に対して、鋭い治療効果と予防効果を発揮し、適期幅の広い薬剤です。
- ② 穂枯れ性病害にも卓越した効果を発揮し、高品質米生産の仕上げ防除剤として適しています。
- ③ 浸透移行性に優れ、速やかにイネ体内に行きわたりの確な効果を発揮します。
- ④ 耐雨性に優れ、降雨による影響を受けにくい薬剤で、雨の合い間の散布でも効果を発揮します。
- ⑤ 長期にわたっていもち病の二次感染阻止効果を発揮します。
- ⑥ 葉いもち発生予察システムに適合し、感染好適条件出現後の防除でも効果を発揮します。
- ⑦ 他剤で耐性のみられるいもち病菌や、ごま葉枯病菌に対しても安定した効果を発揮します。

ノンブラス処理による不活性病斑



いもち病病斑 (無処理)



美しい穂の仕上げをお手伝いします。NONBLAS

人畜毒性:普通物* *毒物及び劇物に該当しないものを指している通称

ノンブラス®粉剤DL


ノンブラスはフェリムゾンにビームを組み合わせた薬剤で、いもち病菌の生活環における侵入・菌糸伸展・病斑形成・孢子形成などの各機能を阻害する薬剤で、いもち病・ごま葉枯病をはじめ、穂枯れ性病害などの防除に適する稲用殺菌剤です。

■適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	使用回数	使用方法
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌、すじ葉枯病菌) 変色米(カーブラリア菌)	3~4kg/ 10a	収穫7日前まで	本剤……………2回以内 トリシクラゾール……………4回以内 (育苗箱への処理は1回、 本田では3回以内) フェリムゾン……………2回以内	散布
	内穎褐変病 もみ枯細菌病 稲こうじ病	4kg/10a			

【参考】田植から収穫までに、いろいろな病原菌が稲の生育や米の品質に影響を与えています。

フェリムゾンは、いもち病・ごま葉枯病をはじめ、米の品質を低下させる穂枯れ性病害にも作用して、美しい穂の仕上げをお手伝いします。



⚠ 使用上の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布してください。
- 野菜類の幼苗及びなし(二十世紀、幸水、新水等)には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意してください。
- たばこ、けいとう及びだいず、あずき、いんげんまめの幼植物には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意してください。
- 使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベル記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所に置かないでください。● 空袋は圃場などに放置せず適切に処理してください。

この印刷物の記載内容は2016年7月現在のものです。