

## 消泡スプレー

### クリカー®

シリコーン…………… 21.3%  
有機溶剤、噴射剤等…………… 78.7%

性状／—  
毒性／—  
有効年限／満5年  
危険物表示／4-1石 II  
包装／180ml×40

(住友化学)

### 特 長

- 数秒間の噴射で簡単に泡を消すことができます。  
農薬の散布液調製時、特に動力噴霧機やスピードスプレーで散布したり、空中散布する時など多量の薬液を調製する時や、散布器具の洗浄時に生じる泡をごく短時間（数秒間）の噴射で手軽に消すことができます。また、薬剤の攪拌前に同様に数秒間噴射しておくことによって泡立ちを未然に防止することができます。したがって多量の薬液調製や残液の確認が極めて容易にできます。
- 薬液の展着性、乳化性等に悪影響を及ぼしません。  
クリカーを通常に使用した場合、薬液の展着性や乳化性等に悪影響を及ぼすことはありません。
- クリカーの使用による薬害事例はありません。

### 適用と使用方法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

適用製剤名	使用目的	使用方法
乳剤 水和剤 液剤など	散布液調製時及び散布器具、容器等の 洗浄時の消泡又は泡立ち防止	噴射 (数秒間)

- 泡に向かって吹きつけるように数秒間噴射してください。噴射後薬液を攪拌すると、より早く消泡できます。
- あらかじめ攪拌前の調製液または調製容器壁に噴射しておくことによって、泡の発生を防止することもできます。

### 使用にあたって

#### ■使用上の注意

- 使う前に必ずよく振ってから使用してください。
- 起泡性を必要とするフォームスプレー（泡散布）用に使用する薬液には使用しないでください。
- ジベレリンなどの植物成長調整剤の調製液には使用しないでください。

#### ■安全使用上の注意

- 使用の際はマスク・手袋などをして噴射した霧を吸入しないように注意し、作業後は顔・手足など皮膚の露出部を石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 火気の付近では使用しないでください。また、室内では使用しないでください。
- 使用後または不要になった時は、噴射ボタンを押して全部噴射させガスを完全に出してから適切に処理してください。また、火中には投げないでください。

#### ■貯蔵上の注意

- 直射日光をさけ、子供の手のとどかない冷暗所に火気をさけて保管してください。

本資料は2023年1月17日現在の内容です。