

殺虫剤

ダントツ[®]箱粒剤

クロチアニジン…………… 1.5%

種類名／クロチアニジン粒剤
 農林水産省登録／第20827号(住友化学登録)
 毒性／普通物*
 有効年限／5年
 包装／1kg×12

特 長

- 長期持続型・育苗箱用殺虫剤
 水稻の初期害虫であるイネミズゾウムシ、イネドロオウムシからツマグロヨコバイ、飛来性のウンカ類まで高い防除効果を示します。
- 浸透移行性に優れ、低濃度で高い活性を示し、長期間効果が持続します。
- 有機リン系、カーバメイト系、合成ピレスロイド系薬剤に対する感受性が低下した害虫にも高い効果を示します。
- ウンカ・ヨコバイ等の重要天敵であるクモ類に対する影響が少ないです。

適用害虫と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲 (箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネミズゾウムシ イネドロオウムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ イネヒメハモグリバエ	育苗箱 〔30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ〕 1箱当り50g 高密度に は種する場合は 1kg/10a 〔育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り 50～100g〕	移植3日前 ～移植当日	本剤 1回 クロチアニジン剤 4回 〔移植時までの処理は1回、 本田での散布、空中散布、 無人航空機散布は合計3回〕	育苗箱の上 から均一に 散布する
	イネクロカメムシ	育苗箱 〔30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ〕 1箱当り50g 高密度に は種する場合は 1kg/10a 〔育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り 50～100g〕	移植当日		
湛水直播水稻	イネミズゾウムシ イネドロオウムシ	1kg/10a	は種時	本剤 1回 クロチアニジン剤 4回 〔は種時までの処理は1回、 本田での散布、空中散布、 無人航空機散布は合計3回〕	は種同時施 薬機を用い て土中施用 する

使用にあたって

■使用上の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、そのまま田植機にかけて移植してください。

- 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当りに乾粕として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの葉量を50から100gまでの範囲で調整してください。
- イネクロカメムシに対しては残効性に注意してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■薬害

- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 誤って過剰に使用したり、本剤使用後4日以上移植せずに育苗箱中におくと葉枯れなどの薬害を生じることもあるので、所定の使用量、使用時期、使用方法を厳守してください。
- 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後田面が露出したりしないように注意してください。移植後は直ちに入水し、水深2～3cm程度を保ち浅水はさけてください。

■水産動植物への注意

- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。

■貯蔵上の注意

- 密封し、直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。