

適用拡大登録

区 分	殺菌剤
農 薬 名	カナメフロアブル
種 類 名	インピルフルキサム水和剤
登 録 番 号	第 24265 号
登 録 会 社	住友化学株式会社
登 録 日	令和 4 年 9 月 7 日

登録内容

農薬登録申請書第 7 項を以下のとおり変更する。

- ・作物名「あずき」および「そらまめ」を追加し、それに伴い、作物名「豆類（種実、ただし、らっかせいを除く）」を「豆類（種実、ただし、あずき、そらまめ、らっかせいを除く）」に変更する。
- ・作物名「未成熟そらまめ」を追加し、それに伴い、作物名「豆類（未成熟、ただし、さやえんどうを除く）」を「豆類（未成熟、ただし、さやえんどう、未成熟そらまめを除く）」に変更する。
- ・作物名「ねぎ」の使用方法「散布」、希釈倍数「4000 倍」に適用病害虫名「葉枯病」を追加する。
- ・作物名「チューリップ」を追加する。

【変更後】（変更する作物のみ抜粋）
適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インピルフルキサムを含む農薬の総使用回数
豆類 (種実、ただし、あずき、そらまめ、らっかせいを除く)	菌核病 灰色かび病	4000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	4 回以内	散布	4 回以内
あずき そらまめ	菌核病 さび病 灰色かび病						
豆類 (未成熟、ただし、さやえんどう、未成熟そらまめを除く)	菌核病 灰色かび病						
未成熟そらまめ	菌核病 さび病 灰色かび病						
ねぎ	黒斑病 葉枯病	4000～ 8000 倍				株元散布	
	さび病						
	黒腐菌核病	4000 倍					
	白絹病	4000～ 8000 倍					
チューリップ	皮腐病 葉腐病	100～200 倍	-	植付前	1 回	15 分間 球根浸漬	1 回

使用上の注意事項
変更なし