

適用拡大登録

区 分	殺 菌 剤
農 薬 名	協友トリフミン水和剤
種 類 名	トリフルミゾール水和剤
登 録 番 号	第 23498 号
登 録 日	令和 5 年 3 月 22 日

登録内容

<適用病害虫名>

- ・作物名「ぶどう」に適用病害虫名「褐斑病」（2000 倍、散布）を追加する。
- ・作物名「いちご」に適用病害虫名「輪斑病」（3000 倍、散布）を追加する。
- ・作物名「メロン」及び「すいか」に適用病害虫名「つる枯病」（3000 倍、散布）を追加する。
- ・作物名「トマト」及び「ミニトマト」に適用病害虫名「うどんこ病」（3000 倍、散布）を追加する。
- ・作物名「かんしょ」に適用病害虫名「つる割病」（500 倍、17 時間苗基部浸漬）を追加する。

<希釈倍数、使用量>

- ・作物名「ねぎ」の使用方法「苗床灌注」に希釈倍数「100 倍」、使用液量「セル成型育苗トレイ 1 箱またはペーパーポット 1 冊 (30×60cm、使用土壌約 5L) 当り 0.5L」を追加する。

【変更内容】（追加する作物のみ抜粋）

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリフルシールを含む農薬の総使用回数
ぶどう	うどんこ病	2000～3000 倍	200～700L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内		3 回以内
	黒とう病 褐斑病	2000 倍					
いちご	じゃのめ病 輪斑病	3000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	5 回以内	散布	5 回以内
	うどんこ病	3000～5000 倍					
メロン	陥没病 つる枯病	3000 倍					
	つる枯病						
すいか	うどんこ病	3000～5000 倍					
トマト ミニトマト	葉かび病	3000～5000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	5 回以内	散布	5 回以内
	すすかび病 うどんこ病	3000 倍					
ねぎ	萎凋病	50 倍	-	定植直前		5～30 分間 苗根部浸漬	
		100 倍	セル成型育苗 トレイ 1 箱または ペーパーポット 1 冊 (30×60cm、 使用土壌約 5L) 当り 0.5L	定植前	1 回	苗床灌注	1 回
		200 倍	セル成型育苗 トレイ 1 箱または ペーパーポット 1 冊 (30×60cm、 使用土壌約 5L) 当り 1L				
かんしょ	基腐病	16 倍	0.8～1.6L/10a	収穫前日まで	2 回以内	無人航空機 による散布	3 回以内 (植付前の処理 は 1 回以内、 植付後は 2 回以内)
		2000～3000 倍	100～300L/10a			散布	
	つる割病	500 倍	-	植付前	1 回	17 時間 苗基部浸漬	

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。