

## 適用拡大登録

区 分	殺菌剤
農薬名	協友アミスターエイト
種類名	アゾキシストロビン水和剤
登録番号	第 21785 号
登録日	令和 6 年 2 月 14 日

## 登録内容

- ・作物名「稲」の使用方法「散布」、希釈倍数「300 倍」、使用液量「25L/10a」に適用病害虫名「稲こうじ病」「穂枯れ（ごま葉枯病菌）」「穂枯れ（すじ葉枯病菌）」「変色米（カーブラリア菌）」「変色米（エピコッカム菌）」「変色米（アルタナリア菌）」を追加する。
- ・作物名「稲」の使用方法「空中散布」に適用病害虫名「稲こうじ病」「穂枯れ（ごま葉枯病菌）」「穂枯れ（すじ葉枯病菌）」「変色米（カーブラリア菌）」「変色米（エピコッカム菌）」「変色米（アルタナリア菌）」を追加する。
- ・作物名「稲」の使用方法「無人ヘリコプターによる散布」を「無人航空機による散布」に変更し、適用病害虫名「稲こうじ病」「穂枯れ（ごま葉枯病菌）」「穂枯れ（すじ葉枯病菌）」「変色米（カーブラリア菌）」「変色米（エピコッカム菌）」「変色米（アルタナリア菌）」を追加する。

## 【変更後】

## 7. 適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	アグリストピンを 含む 農薬の 総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌)	1000～ 1500倍	100～200L /10a	収穫14日 前まで	3回 以内	散布	4回以内 (育苗箱 散布は 1回以内、 本田では 3回以内)
	稲こうじ病 穂枯れ (すじ葉枯病菌) 変色米 (カーブラリア菌) 変色米 (エピコッカム菌) 変色米 (アルタナリア菌)	1000倍					
	いもち病	300倍	25L/10a			空中散布	
	紋枯病	原液	120～150mL /10a				
	稲こうじ病	8倍	800mL/10a				
	穂枯れ (ごま葉枯病菌)	30倍	3L/10a				
	穂枯れ (すじ葉枯病菌)	8倍	800mL/10a				
	変色米 (カーブラリア菌)						
	変色米 (エピコッカム菌)						
	変色米 (アルタナリア菌)					無人航空機 による散布	

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。