

適用拡大登録

区 分	殺菌剤
農 薬 名	ヘルコートフロアブル
種 類 名	イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤
登 録 番 号	第 19884 号
登 録 会 社	日本曹達株式会社
登 録 日	令和 6 年 2 月 28 日

登録内容

農薬登録申請書第 7 項について次のとおり変更し、【変更後】のとおりとする。

< 作物名 >

作物名「レタス」を追加する。

< 適用病害虫名 >

作物名「チューリップ」に適用病害虫名「灰色かび病」を追加する。

< 希釈倍数 >

作物名「かぼちゃ」の希釈倍数「1000 倍」を「1000～2000 倍」に変更する。

< 使用液量 >

作物名「みかん」の使用方法「無人航空機による散布」の使用液量を次のとおり変更する。

- ・適用病害虫名「灰色かび病」について使用液量「4L/10a」及び「8L/10a」をそれぞれ「4～5L/10a」、「8～10L/10a」に変更する。
- ・適用病害虫名「貯蔵病害(青かび病)」及び「貯蔵病害(緑かび病)」について使用液量「5L/10a」及び「10L/10a」をそれぞれ「4～5L/10a」、「8～10L/10a」に変更する。

< 使用時期 >

作物名「みかん」の使用方法「無人航空機による散布」について使用時期「収穫 3 日前まで」を「収穫前日まで」に変更する。

作物名「チューリップ」の使用時期「発生初期」を「発病前～発病初期」に変更する。

< 使用方法 >

作物名「かんきつ(みかんを除く)」の適用病害虫名「灰色かび病」、「貯蔵病害(青かび病)」及び「貯蔵病害(緑かび病)」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。

(次頁に続く)

【変更後】(追加・変更する作物のみ記載)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミクタジンを 含む農薬の 総使用回数
みかん	そうか病 貯蔵病害(軸腐病)	1000 倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病)	1000～ 2000 倍					
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	10 倍 20 倍	4～5L/10a 8～10L/10a			無人航空機 による散布	
かんきつ (みかんを 除く)	そうか病 貯蔵病害(軸腐病) 幹腐病	1000 倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	2 回以内
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病)	1000～ 2000 倍					
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	10 倍 20 倍	4～5L/10a 8～10L/10a			無人航空機 による散布	
レタス	菌核病	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫 14 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内
かぼちゃ	うどんこ病	1000～ 2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日 前まで	4 回以内		4 回以内
チェリーフ	褐色斑点病 灰色かび病	1000 倍		発病前～ 発病初期	8 回以内		8 回以内

使用上の注意事項

変更なし

以上