

適用拡大登録

区 分	殺菌剤
農 薬 名	協友トップジンM水和剤
種 類 名	チオファネートメチル水和剤
登 録 番 号	第 23108 号
登 録 日	令和 6 年 3 月 13 日

登録内容

<作物名>

- 作物名「つつじ類」、「かし」、「さくら」、「じんちょうげ」、「ぼけ」、「ポプラ」及び「いぬつげ」を削除し、作物名「樹木類（つつじ類、かし、さくら、じんちょうげ、ぼけ、ポプラ、いぬつげを除く）」を「樹木類」に変更する。

<適用病害虫名>

- 作物名「みかん」及び「かんきつ（みかんを除く）」に適用病害虫名「貯蔵病害（黒斑病）」を追加する。
- 作物名「小粒核果類」に適用病害虫名「すす斑病（うめ）」を追加する。
- 作物名「ブロッコリー」に適用病害虫名「根朽病」を追加する。
- 作物名「メロン」に適用病害虫名「菌核病」を追加する。
- 作物名「ピーマン」に適用病害虫名「炭疽病」を追加する。
- 作物名「ねぎ」について次のとおり変更する。
 - 使用方法「散布」に適用病害虫名「萎凋病」、「黒腐菌核病」及び「小菌核病」を追加する。
 - 使用方法「苗床灌注」に適用病害虫名「萎凋病」及び「黒腐菌核病」を追加する。
- 作物名「樹木類」に適用病害虫名「褐斑病（つつじ類）」、「幼果菌核病（さくら）」、「紫かび病（かし）」、「黒点病（じんちょうげ）」、「褐斑病（ぼけ）」、「マルヅニナ落葉病（ポプラ）」、「枝枯病（いぬつげ）」及び「赤枯病（すぎ）」を追加する。

<希釈倍数>

- 作物名「くり」の希釈倍数「1000 倍」を「1000～1500 倍」に変更する。

変更後（追加・変更する作物のみ抜粋）

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数
みかん	そうか病	30 倍	200～ 700L/10a	4～6 月	5 回以内	空中散布	8 回以内 (塗布は 3 回以内、 散布、空中散布及 び無人航空機散 布は 合計 5 回以内)
	灰色かび病 そうか病	1000～ 1500 倍					
	貯蔵病害(黒斑病)	2000 倍					
	貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	2000～ 3000 倍					
かんきつ (みかんを 除く)	貯蔵病害(黒斑病)	2000 倍					8 回以内 (塗布は 3 回以内、 散布及び 無人航空機散布 は合計 5 回以内)
小粒 核果類	すす斑病 (うめ)	1000 倍				散布	すももは 6 回以内 (塗布は 3 回以内、 休眠期の散布は 1 回以内、 生育期の散布は 3 回以内)、 その他の 小粒核果類は 6 回以内 (塗布は 3 回以内、 散布は 3 回以内)
	灰星病 環紋葉枯病 葉炭疽病 黒星病 黒粒枝枯病	1000～ 1500 倍		収穫 21 日 前まで	3 回以内		
くり	実炭疽病			収穫 3 日 前まで	4 回以内		7 回以内 (散布は 4 回以内、 塗布は 3 回以内)
ブロッコリー	菌核病 根朽病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 14 日 前まで	2 回以内		3 回以内 (種子への処理は 1 回以内、 は種後は 2 回以内)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数
メロン	つる枯病 陥没病 菌核病	1500～ 2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	5 回以内 (種子への処理は 1 回以内、 塗布は 1 回以内、 散布は 3 回以内)
ピーマン	黒枯病 炭疽病	4000～ 6000 倍		収穫前日 まで	3 回以内		4 回以内 (種子への処理は 1 回以内、 は種後は 3 回以内)
ねぎ	萎凋病 黒腐菌核病 小菌核病 小菌核腐敗病	1000 倍		収穫 7 日 前まで	3 回以内		5 回以内 (種子への処理は 1 回以内、 苗根部浸漬及び 苗床灌注は 合計 1 回以内、 散布及び 株元散布は 合計 3 回以内)
	萎凋病 黒腐菌核病 小菌核腐敗病	250 倍	チェーンポット 1 冊 (30×60cm、 土壌量約 5L) 当り 0.5～1L	定植直前	1 回	苗床灌注	
	萎凋病 小菌核腐敗病	20 倍	—	定植直前	1 回	3 分間 苗根部 浸漬	
	200 倍	30 分間 苗根部 浸漬					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数
樹木類	炭疽病	1000～ 2000 倍	200～ 700L/10a	発病初期	5 回以内	散布	5 回以内
	褐斑病(つつじ類) 幼果菌核病(さくら)	1000～ 1500 倍					
	うどんこ病 ごま色斑点病 輪紋葉枯病 斑点症(シュートサコス [®] ラ菌) 紫かび病(かし) 黒点病(じんちょうげ) 褐斑病(ぼけ) マルメニ [®] 落葉病(ホ [®] アラ) 枝枯病(いぬつげ) 赤枯病(すぎ)	1000 倍					

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。