

適用拡大登録

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	協友マラソン乳剤 50
種 類 名	マラソン乳剤
登 録 番 号	第 21901 号
登 録 日	令和 6 年 5 月 15 日

登録内容

- ・作物名「だいず」、「あずき」および「えんどうまめ」の適用病害虫名「ナモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更し、希釈倍数「2000～3000倍」を「1000～3000倍」に変更する。
- ・作物名「いんげんまめ」の適用病害虫名「ナモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更し、希釈倍数「2000倍」を「1000～2000倍」に、「2000～3000倍」を「1000～3000倍」に変更する。
- ・作物名「だいこん」、「かぶ」、「はくさい」、「キャベツ」、「カリフラワー」、「ブロッコリー」、「たまねぎ」、「ねぎ」、「きゅうり」、「メロン」、「うり類（漬物用）」、「かぼちゃ」および「すいか」の希釈倍数「2000～3000倍」を「1000～3000倍」に変更する。
- ・作物名「豆類（未成熟）」の希釈倍数「2000倍」を「1000～2000倍」に、「2000～3000倍」を「1000～3000倍」に変更する。
- ・作物名「かんきつ（なつみかんを除く）」、「りんご」、「なし」、「もも」、「うめ」、「おうとう」、「ぶどう」および「かき」の希釈倍数「2000～3000倍」を「1000～3000倍」に変更する。
- ・作物名「びわ」に適用病害虫名「ビワキジラミ」を追加する。

【変更後】(変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マラソンを含む農薬の総使用回数			
だいず あずき えんどうまめ	ハモグリバエ類 マシクイガ	1000 倍	100~300 L/10a	収穫 7 日 前まで	3 回 以内	散布	3 回以内			
	アザミマ類 アブラムシ類 コガネムシ類 ハダニ類	1000~ 3000 倍								
いんげんまめ	ハモグリバエ類 マシクイガ	1000 倍								
	インゲンテントウ	1000~ 2000 倍								
	アザミマ類 アブラムシ類 コガネムシ類 ハダニ類	1000~ 3000 倍								
だいこん	アオムシ カブラハバチ ハモグリバエ	1000 倍						収穫 14 日 前まで	6 回 以内	6 回以内
	アブラムシ類	1000~ 3000 倍								
かぶ	アオムシ カブラハバチ ハモグリバエ	1000 倍						収穫 14 日 前まで	4 回 以内	4 回以内
	アブラムシ類	1000~ 3000 倍								
はくさい キャベツ	アオムシ カブラハバチ	1000 倍						収穫前日 まで	5 回 以内	5 回以内
	アザミマ類 アブラムシ類	1000~ 3000 倍								
カリフラワー ブロッコリー	アオムシ カブラハバチ	1000 倍						収穫 3 日 前まで	5 回 以内	5 回以内
	アザミマ類 アブラムシ類	1000~ 3000 倍								
たまねぎ	ハモグリバエ類	1000 倍						収穫 7 日 前まで	6 回 以内	6 回以内
	アザミマ類 アブラムシ類	1000~ 3000 倍								
ねぎ	ネギハモグリバエ	1000 倍						収穫 7 日 前まで	6 回 以内	6 回以内
	アザミマ類 アブラムシ類	1000~ 3000 倍								
きゅうり メロン うり類(漬物用)	ウリハムシ	1000 倍	収穫前日 まで	3 回 以内	3 回以内					
	アブラムシ類 ハダニ類	1000~ 3000 倍								

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マラソンを含む農薬の総使用回数		
かぼちゃ	ウリハムシ	1000 倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	5 回以内	散布	5 回以内		
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000 倍							
すいか	ウリハムシ	1000 倍		収穫 7 日前まで	3 回以内		6 回以内	3 回以内	
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000 倍							
豆類(未成熟)	カメムシ類 ハメグリハエ類 マメシクイガ	1000 倍		収穫 7 日前まで	3 回以内			3 回以内	
	インゲンテントウ	1000～ 2000 倍							
	アザミウマ類 アブラムシ類 コガネムシ類 ハダニ類	1000～ 3000 倍							
かんきつ (なつみかんを除く)	カイガラムシ類 ハマキムシ類 アオハコロモ ヤノネカイガラムシ若齢幼虫	1000～ 2000 倍		200～700 L/10a	収穫 14 日前まで		5 回以内	散布	5 回以内
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000 倍							
りんご	モモシクイガ	1000 倍			収穫 14 日前まで				5 回以内
	カイガラムシ類 ハマキムシ類 ナシヒメシクイ	1000～ 2000 倍							
	アブラムシ類 ハダニ類 リンゴワタムシ	1000～ 3000 倍							
なし	カイガラムシ類 ハマキムシ類 ナシヒメシクイ	1000～ 2000 倍	収穫 7 日前まで		5 回以内	5 回以内 (休眠期は 1 回以内)			
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000 倍							
もも	モモシクイガ	1000 倍	収穫 7 日前まで		5 回以内	5 回以内			
	カイガラムシ類 ナシヒメシクイ	1000～ 2000 倍							
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000 倍							
うめ	カイガラムシ類 ハマキムシ類	1000～ 2000 倍	収穫 7 日前まで	5 回以内	5 回以内				
	アブラムシ類	1000～ 3000 倍							

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マラソンを含む農薬の総使用回数	
おうとう	ハマキムシ類	1000～2000 倍	200～700 L/10a	収穫 7 日前まで	5 回以内	散布	5 回以内 (休眠期の 50 倍希釈 散布は 1 回以内)	
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～3000 倍						
ぶどう	キンケチブトゾウムシ成虫	1000 倍		収穫 30 日前まで	4 回以内		6 回以内	6 回以内
	カイラムシ類 ハマキムシ類	1000～2000 倍						
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～3000 倍						
かき	カイラムシ類 ハマキムシ類	1000～2000 倍		収穫 7 日前まで	5 回以内		4 回以内	4 回以内
	イガ類	1000～3000 倍						
びわ	ビワキンラムシ	2000 倍				5 回以内		

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。