

適用拡大登録

区 分	殺菌剤
農 薬 名	パレード 20 フロアブル
種 類 名	ピラジフルミド水和剤
登 録 番 号	第 24071 号
登 録 会 社	日本農薬株式会社
登 録 日	令和 7 年 7 月 9 日

登録内容

農薬登録申請書第 7 項を以下のとおり変更する（変更後は別紙）。

適用病虫害名の追加：

- (1)豆類（種実、ただし、らっかせいを除く）、豆類（未成熟）：褐色輪紋病（だいず）/2000 倍、さび病（あずき、さやえんどう）/2000 倍
- (2)はなやさい類：苗立枯病（リゾクトニア菌）/100 倍
- (3)レタス、非結球レタス：白絹病/2000 倍/散布、白絹病/100 倍/灌注
- (4)りんどう：褐斑病、葉枯病/2000 倍

使用上の注意事項

変更なし

別紙 1

【変更後】(変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数			
豆類（種実、ただし、らっかせいを除く）、豆類（未成熟）	菌核病 灰色かび病 うどんこ病（だいず、さやえんどう） 褐紋病（さやえんどう）	2000～4000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内			
	褐色輪紋病（だいず） さび病（あずき、さやえんどう）	2000 倍								
はなやさい類	菌核病 黒すす病	2000～4000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内（灌注は 1 回以内）			
		16 倍	1.6L/10a			無人航空機による散布				
		20 倍	2.0L/10a							
		32 倍	3.2L/10a							
	苗立枯病（リゾクトニア菌）	100 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱または、ペーパーポット 1 冊（約 30×60cm、使用土壌約 1.5～4L）当り 0.5L	育苗期後半～定植当日	1 回	灌注				
	レタス 非結球レタス	菌核病 灰色かび病 すそ枯病	2000～4000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3 回以内		散布	3 回以内（灌注は 1 回以内）	
白絹病	2000 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱または、ペーパーポット 1 冊（約 30×60cm、使用土壌約 1.5～4L）当り 0.5L	育苗期後半～定植当日	1 回	灌注					
菌核病 すそ枯病 白絹病	100 倍									
菌核病 灰色かび病	16 倍					1.6L/10a	収穫前日まで	3 回以内		無人航空機による散布
	20 倍					2.0L/10a				
	32 倍					3.2L/10a				
りんどう	黒斑病 花腐菌核病	2000 倍	100～300L/10a	発病初期	3 回以内	散布	3 回以内			
	褐斑病 葉枯病			発病前						
	うどんこ病	4000 倍		発病初期						