

適用拡大登録

区 分	殺虫剤
農 薬 名	ディアナ SC
種 類 名	スピネトラム水和剤
登 録 番 号	第 22910 号
登 録 会 社	住友化学株式会社
登 録 日	令和 7 年 10 月 1 日

登録内容

農薬登録申請書第 7 項「適用病害虫の範囲及び使用方法」を以下のとおり変更し、別紙のとおりとする。

- ・作物名「みしまさいこ」を追加する。
- ・作物名「かんしょ」の適用病害虫名「ヒルガオハモグリガ」の希釈倍数「2500倍」を「2500～5000倍」に変更する。
- ・作物名「かんしょ」の使用方法「無人航空機による散布」に適用病害虫名「ヒルガオハモグリガ」を追加し、希釈倍数「32倍」および「64倍」をそれぞれ「32～40倍」および「40～80倍」に、使用液量「0.8L/10a」を「0.8～1.6L/10a」に変更する。
- ・作物名「はくさい」のスピネトラムを含む農薬の総使用回数「3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内）」を「3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内）」に変更する。
- ・作物名「キャベツ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加し、スピネトラムを含む農薬の総使用回数「3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内）」を「3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内）」に変更する。
- ・作物名「非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、チンゲンサイ、なばな類を除く)」、「こまつな」および「なばな類」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」を追加する。
- ・作物名「カリフラワー」のスピネトラムを含む農薬の総使用回数「3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内）」を「3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内）」に変更する。
- ・作物名「たまねぎ」の使用方法「無人航空機による散布」に適用病害虫名「ハスモンヨトウ」を追加し、使用液量「1.6L/10a」を「1.6～3.2L/10a」に変更する。
- ・作物名「らっきょう」のスピネトラムを含む農薬の総使用回数「3回以内（種球浸漬は1回以内、散布は2回以内）」を「3回以内（植付前までの処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。
- ・作物名「にんじん」に適用病害虫名「キアゲハ」を追加する。
- ・作物名「トマト」および「ミニトマト」の希釈倍数「2500倍」に適用病害虫名「チバクロバネキノコバエ」を追加する。

使用上の注意事項

変更なし

別紙

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｽﾍﾞｯﾄﾗﾑを含む農薬の総使用回数
みしまさいこ	ハモンヨトウ	2500～5000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	4 回以内 (1 年間に 2 回以内)	散布	4 回以内 (1 年間に 2 回以内)
かんしょ	ナカジロシタバ ハモンヨトウ	32～40 倍	0.8～1.6L/10a		無人航空機による散布	2 回以内	2 回以内
	ヒルガオハモグリカ	40～80 倍	1.6L/10a				
はくさい	アザミウマ類 ウリハダ類 アオムシ オオタバコガ コナガ ハイマダラノメカ ハモンヨトウ ヨトウムシ	2500～5000 倍	100～300L/10a	育苗期後半	1 回	灌注	3 回以内 (定植時までの処理は 1 回以内、定植後は 2 回以内)
キャベツ	アザミウマ類	50～200 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱 または ペーパーポット 1 冊 (30×60cm・ 使用土壌約 3～4L) 当り 0.5L	2 回以内	1 回	散布	
	アザミウマ類 ウリハダ類 ハモグリハダ類 アオムシ オオタバコガ コナガ ハイマダラノメカ ハモンヨトウ ヨトウムシ	2500～5000 倍	100～300L/10a				
	アオムシ オオタバコガ コナガ ハモンヨトウ ヨトウムシ	48 倍	1.6～3.2L/10a	無人航空機による散布	2 回以内	無人航空機による散布	
	アオムシ オオタバコガ コナガ ハモンヨトウ ヨトウムシ	96 倍	3.2L/10a				
非結球あぶらな科 葉菜類 (こまつな、 チンゲンサイ、 なばな類を除く)	アザミウマ類 ハモグリハダ類 コナガ ハモンヨトウ	2500～5000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内
こまつな	ハクサイタニ	2500 倍					
	アザミウマ類 ハモグリハダ類 アオムシ コナガ ハイマダラノメカ ハモンヨトウ ヨトウムシ	2500～5000 倍					
なばな類	アザミウマ類 ハモグリハダ類 コナガ ハクサイタニ ハモンヨトウ	2500～5000 倍					
カリフラワー	アザミウマ類 アオムシ コナガ ハイマダラノメカ ハモンヨトウ ヨトウムシ	2500～5000 倍	3 回以内 (定植時までの処理は 1 回以内、定植後は 2 回以内)				

(次頁に続く)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピネラムを含む農薬の総使用回数
たまねぎ	アザミウマ類 シロイハナシヨトウ ネキハモグリハエ ハスモンヨトウ	2500～ 5000 倍	100～300L/10a	収穫前日 まで	2 回 以内	散布	2 回以内
	アザミウマ類 ネキハモグリハエ ハスモンヨトウ	48 倍	1.6～3.2L/10a				
		96 倍	3.2L/10a				
らっきょう	ネギニ類	2500 倍	—	植付前	1 回	30 分間 種球浸漬	3 回以内 (植付前までの 処理は 1 回以内、 植付後は 2 回以内)
	アザミウマ類 ハモグリハエ類	2500～ 5000 倍	100～300L/10a	収穫前日 まで	2 回 以内	散布	
にんじん	キアゲハ ハスモンヨトウ						
トマト ミニトマト	コナジラミ類 チバクロハネキコバエ	2500 倍					
	アザミウマ類 ハモグリハエ類 オオタバコガ トマトキハガ ハスモンヨトウ	2500～ 5000 倍					