

適用拡大登録

区分	殺菌剤
農薬名	ベルクートフロアブル
種類名	イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤
登録番号	第 19884 号
登録会社	日本曹達株式会社
登録日	令和 7 年 11 月 26 日

登録内容

農薬登録申請書第 7 項について次のとおり変更し、別紙【変更後】のとおりとする。

- 作物名「りんどう」を追加する。
- 作物名「りんご」について次のとおり変更する。
 - ・適用病害虫名「黒点病」の希釈倍数「1000 倍」を「1000～1500 倍」に変更する。
 - ・適用病害虫名「うどんこ病」、「黄腐病」及び「モニリア病」を追加する。
- 作物名「みかん」及び「かんきつ(みかんを除く)」に適用病害虫名「貯蔵病害(白かび病)」を追加する。
- 作物名「たまねぎ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。

使用上の注意事項

変更なし

別紙

【変更後】(追加・変更する作物のみ記載)

作物名	適用病害虫名	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベノクタシンを含む農薬の総使用回数
りんどう	葉枯病 花腐菌核病		300L/10a	発病前～発病初期	8回以内		8回以内
りんご	斑点落葉病 黒星病 輪紋病 褐斑病 すす点病 すす斑病 黒点病 うどんこ病 黄腐病 モニリア病	1000～ 1500 倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで	6回以内 (但し、 開花期以降 散布は 3回以内)	散布	8回以内 (液剤及び水和剤は 合計6回以内 (開花期以降は 3回以内)、 塗布剤は2回以内)
みかん	そうか病 貯蔵病害(軸腐病) 灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(白かび病)	1000 倍 1000～ 2000 倍	200～ 700L/10a		3回以内	散布	3回以内
かんきつ (みかんを除く)	そうか病 貯蔵病害(軸腐病) 幹腐病 灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(白かび病)	1000 倍 1000～ 2000 倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	1000 倍 8 倍	100～ 300L/10a 1.6～ 3.2L/10a		5回以内	散布 無人航空機による散布	5回以内