

殺菌剤

フジワンモンカット®粒剤

イソプロチオラン…………… 12.0%
フルトラニル…………… 7.0%

種類名/イソプロチオラン・フルトラニル粒剤
農林水産省登録/第16841号(日本農薬登録)
毒性/普通物*
有効年限/4年
包装/3kg×6

特長

- フジワンとモンカットを配剤したいもち病、紋枯病、稲こじ病を同時防除できる水稲用殺菌剤です。
- 両成分とも稲体への吸収移行性に優れ、安定した防除効果が長期間持続します。
- 散布適期幅が広いいため、余裕をもって使用できます。

適用病害と使用方法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

| 作物名 | 適用病害名 | 10a当り 使用量 | 使用時期 | 総使用回数* | 使用方法 |
|-----|-------------|--------------|--------------------------|--|------|
| 稲 | いもち病 紋枯病 | 3～4kg | 出穂30～10日前 但し、収穫30日前まで | 本剤 2回 イソプロチオラン剤 3回 [移植前は1回、 本田では2回] | 湛水散布 |
| | 稲こじ病 | 4kg | | フルトラニル剤 4回 | |

使用にあたって

■使用上の注意

- 育苗箱には使用しないでください。
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 散布に当っては、田水深を3cm以上の湛水状態とし、散布後少なくとも3～4日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。なお、極端な漏水田での使用はさけてください。
- 本剤の使用適期は通常出穂20日前頃ですが、稲の品種あるいは地域により前後することがあり、また、多発時の散布は効果が劣る場合があるので、使用に当っては病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■水産動植物への注意

- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。

■安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。



- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

■貯蔵上の注意

- 密封し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2025年12月23日現在の登録内容に基づいています。