

適用拡大登録

区分	殺菌剤
農薬名	カナメフロアブル
種類名	インピルフルキサム水和剤
登録番号	第 24265 号
登録会社	住友化学株式会社
登録日	令和 8 年 2 月 4 日

登録内容

農薬登録申請書第 7 項を以下のとおり変更する。

- 作物名「ねぎ」の希釀倍数「4000 倍」、使用方法「散布」に適用病害虫名「黒腐菌核病」および「小菌核病」を追加する。
- 作物名「とうとう」に適用病害虫名「褐色せん孔病」および「黒斑病」を追加する。
- 作物名「チューリップ」に適用病害虫名「皮腐病」、使用方法「散布」を追加し、インピルフルキサムを含む農薬の総使用回数「1回」を「4回以内（球根への処理は1回以内、植付後は3回以内）」に変更する。
- 作物名「りんどう」に適用病害虫名「葉枯病」および「花腐菌核病」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インピルフルキサムを含む農薬の総使用回数
ねぎ	黒腐菌核病 黒斑病 小菌核病 白絹病 葉枯病	4000 倍	100~300 L/10a	収穫前日まで	4 回以内	散布	4 回以内
	さび病	4000~8000 倍					
	黒腐菌核病	4000 倍					
	白絹病	4000~8000 倍				株元散布	
とうとう	褐色せん孔病 黒斑病 灰星病	4000 倍	200~700 L/10a	3 回以内	散布	3 回以内	4 回以内 (球根への処理は 1回以内、 植付後は 3回以内)
チューリップ	皮腐病 葉腐病	100~200 倍	—				
	皮腐病	2000 倍	100~300 L/10a	発病前	1 回	15 分間球根浸漬	
りんどう	葉枯病 花腐菌核病	4000 倍			3 回以内	散布	
	黒斑病			発病初期		3 回以内	

使用上の注意事項

変更なし

以上