

適用拡大登録

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	協友スミチオン乳剤
種 類 名	ME P 乳剤
登 録 番 号	第 21949 号
登 録 日	令和 8 年 8 月 26 日

登録内容

- ・作物名「稲」の希釈倍数「1 0 0 0 倍」の適用病害虫名「ヒメトビウンカ」を「ウンカ類」に変更する。
- ・作物名「たまねぎ」および「ねぎ」の希釈倍数「1 0 0 0 ～ 2 0 0 0 倍」を「7 0 0 ～ 2 0 0 0 倍」に変更する。
- ・作物名「ねぎ」の希釈倍数「1 0 0 0 倍」を「7 0 0 ～ 1 0 0 0 倍」に変更する。
- ・作物名「トマト」に適用病害虫名「トマトキバガ」を追加する。
- ・作物名「なす」に適用病害虫名「クロテンコナカイガラムシ」を追加する。
- ・作物名「かぼちゃ」および「すいか」の希釈倍数「1 0 0 0 ～ 2 0 0 0 倍」を「7 0 0 ～ 2 0 0 0 倍」に変更する。
- ・作物名「ほうれんそう」の適用病害虫名「ハウレンソウケナガコナダニ」を「ケナガコナダニ類」に変更する。
- ・作物名「りんご」および「もも」の適用病害虫名「ナシヒメシンクイ」および「モモシンクイガ」を「シンクイムシ類」に変更する。
- ・作物名「りんご」、「なし（有袋栽培）」および「なし（無袋栽培）」の適用病害虫名「アメリカシロヒトリ」を「ケムシ類」に、「クワコナカイガラムシ」を「カイガラムシ類」に変更し、希釈倍数「1 5 0 0 倍」を「1 0 0 0 ～ 1 5 0 0 倍」に変更する。
- ・作物名「もも」の適用病害虫名「クワシロカイガラムシ」および「クワコナカイガラムシ」を「カイガラムシ類」に変更し、希釈倍数を「1 0 0 0 ～ 1 5 0 0 倍」にする。
- ・作物名「うめ」および「おうとう」の適用病害虫名「アメリカシロヒトリ」を「ケムシ類」に変更する。
- ・作物名「大粒種ぶどう」および「小粒種ぶどう」の適用病害虫名「クワコナカイガラムシ」を「カイガラムシ類」に変更し、希釈倍数「1 5 0 0 倍」を「1 0 0 0 ～ 1 5 0 0 倍」に変更する。
- ・作物名「かき」の適用病害虫名「アメリカシロヒトリ」を「ケムシ類」に変更する。
- ・作物名「茶」に適用病害虫名「ルビーロウムシ」を追加し、希釈倍数「1 0 0 0 倍」を「7 0 0 ～ 1 0 0 0 倍」に変更する。
- ・作物名「樹木類」の適用病害虫名「アメリカシロヒトリ」を「ケムシ類」に変更し、希釈倍数「1 0 0 0 倍」を「5 0 0 ～ 1 0 0 0 倍」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	MEP を含む 農薬の 総使用回数			
稲	イネシカ [®] レンチュウ	100 倍	—	は種前	1 回	専用の種子消毒機 を用いて乾燥種粒 重量の 3%の量の 希釈液を種粒に吹 付け処理又は塗沫 処理	3 回以内 (種もみへ の処理は 1 回以内、 育苗箱 散布は 1 回以内、 本田では 2 回以内)			
		1000 倍				6～72 時間浸漬				
	カメシ類 ニカメイチュウ	300 倍	25L/10a	収穫 21 日前 まで	2 回 以内	散布				
	ニカメイチュウ第 2 世代 サンカメイチュウ第 3 世代	800～1000 倍								
	アブラムシ類 ウンカ類 カメシ類 アワヨトリ イネシカ [®] レンチュウ イネツトムシ イネト [®] ロオムシ	1000 倍								
	ニカメイチュウ第 1 世代 イネハモク [®] リハ [®] エ	1000～ 2000 倍								
	フタホビ [®] コヤカ [®]	2000～ 4000 倍								
	イネヒメハモク [®] リハ [®] エ	2500 倍								
	カメシ類 ニカメイチュウ	8 倍	800mL/10a			無人航空機 による散布				
	カメシ類 イネツトムシ イネハモク [®] リハ [®] エ イネヒメハモク [®] リハ [®] エ ニカメイチュウ ヒメトビ [®] ウンカ フタホビ [®] コヤカ [®]	30 倍	3L/10a			空中散布				
たまねぎ	アザミウマ類	700～1000 倍	100～300 L/10a			散布	2回以内			
	アブラムシ類	700～2000 倍								
ねぎ	アザミウマ類 ネギ [®] コカ [®]	700～1000 倍		収穫 14 日前 まで	5 回 以内				5回以内	
	アブラムシ類	700～2000 倍		収穫前日 まで						
トマト	アブラムシ類 オオニジ [®] ユウヤホシテントウ トマトキバ [®] ガ [®]	2000 倍					収穫 14 日前 まで		3 回 以内	3 回以内
なす	アブラムシ類 テントウムシダ [®] マン類 クロテンコナカイガ [®] ラムシ	1000～ 2000 倍		収穫 3 日前 まで			6 回 以内		6 回以内	
かぼちゃ	アザミウマ類	700～1000 倍								
	アブラムシ類	700～2000 倍								
すいか	アザミウマ類	700～1000 倍								
	アブラムシ類	700～2000 倍								

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	MEP を含む 農薬の 総使用回数
ほうれんそう	アブラムシ類 ケガレコナダニ類	1000～ 2000 倍	100～300 L/10a	収穫 21 日前 まで	2 回 以内	散布	2回以内
りんご	ケムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 ナシゲンバイ	1000 倍	200～700 L/10a	収穫 30 日前 まで	3 回 以内		3回以内
	カイガラムシ類	1000～ 1500 倍					
	アブラムシ類	1000～ 2000 倍					
なし (有袋栽培)	カメムシ類 ケムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 ナシゲンバイ ナシヒゲカ ナシホソカ	1000 倍		収穫 14 日前 まで	6 回 以内		6回以内
	カイガラムシ類	1000～ 1500 倍					
	アブラムシ類	1000～ 2000 倍					
なし (無袋栽培)	カメムシ類 ケムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 ナシゲンバイ ナシヒゲカ ナシホソカ	1000 倍		収穫 21 日前 まで	6 回 以内		
	カイガラムシ類	1000～ 1500 倍					
	アブラムシ類	1000～ 2000 倍					
もも	クビアカツヤカミキリ	1000 倍		成虫発生初期但 し、収穫 3 日前まで	2 回 以内		6回以内 (樹幹処理は 1回以内)
	カメムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類			収穫 3 日前 まで			
	カイガラムシ類	1000～ 1500 倍					
	アブラムシ類 モモハモグサリガ ナシヒメシンクイ (心折防止)	1000～ 2000 倍					
うめ	クビアカツヤカミキリ	1000 倍	成虫発生初期但 し、収穫 14 日前まで	2 回 以内	2回以内		
	ケムシ類 ハマキムシ類		収穫 14 日前 まで				
	アブラムシ類					1000～ 2000 倍	

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	MEP を含む 農薬の 総使用回数
おうとう	ケムシ類 ハマキムシ類 ナシゲンバイ	1000 倍	200～700 L/10a	収穫 14 日前 まで	2 回 以内	散布	2回以内 (樹幹処理 及び灌注 処理は合計 1回以内)
	アブラムシ類	1000～ 2000 倍		収穫 21 日前 まで			4回以内 (収穫終了後 から萌芽 までは 2回以内、 萌芽後は 2回以内)
大粒種ぶどう	ハマキムシ類 キンケクチフトゾウムシ成虫 ブドウウラカミキリ	1000 倍					
	カイガラムシ類	1000～ 1500 倍					
	アブラムシ類 フタデヒメヨコバイ ブドウウサシバ ブドウトリバ	1000～ 2000 倍					
小粒種ぶどう	ハマキムシ類 キンケクチフトゾウムシ成虫 ブドウウラカミキリ	1000 倍		収穫 90 日前 まで			
	カイガラムシ類	1000～ 1500 倍					
	アブラムシ類 フタデヒメヨコバイ ブドウウサシバ ブドウトリバ	1000～ 2000 倍					
かき	イワガキ類 カイガラムシ類 カメムシ類 ケムシ類 ハマキムシ類 ミノガキ類若齢幼虫 カキノハタムシガ カキノソガ	1000 倍		収穫 30 日前 まで	3 回 以内	3回以内 (樹幹処理は 2回以内)	
茶	ミノガキ類 コクモンハマキ チャノソガ ルビノロウムシ	700～1000 倍	200～400 L/10a	摘採 21 日前 まで	1 回	1回	
樹木類	オオハリセンチュウ	500 倍	—	移植前		30 分間 根部浸漬	6回以内
	アブラムシ類 ゲンバイムシ類 ケムシ類 フタババラゾウムシ	500～1000 倍	200～700 L/10a	—	散布		

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。