

適用拡大登録

区	分	殺虫殺菌剤		
農	薬	名	稲大将箱粒剤	
種	類	名	オキサゾスルフィル・イソチアニル・ インピルフルキサム粒剤	
登	録	番	号	第 24616 号
登	録	日	令和 8 年 10 月 7 日	

登録内容

- ・作物名「稲」に適用病害虫名「イネドロオイムシ」、「イネミズゾウムシ」、「ニカメイチュウ」および「フタオビコヤガ」を追加する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」に適用病害虫名「疑似紋枯症（褐色菌核病菌）」、「疑似紋枯症（褐色紋枯病菌）」、「疑似紋枯症（赤色菌核病菌）」、「カメムシ類」、「イネカラバエ」、「イネヒメハモグリバエ」および「ケラ」、使用時期「移植当日」を追加する。

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	オキサゾスルフィル を含む 農薬の 総使用回数	イソシアニル を含む 農薬の 総使用回数	インピルフルキサム を含む 農薬の 総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 イネトモイムシ イネミスゾウムシ ニカメイチュウ フタオビコヤカ	1kg/10a	移植時	1 回	側条施用	1 回	3 回以内 (直播での は種時 又は 移植時までの 処理は 1 回以内、 本田では 2 回以内)	
稲 (箱育苗)	苗立枯細菌病 苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌)	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50g	は種時 (覆土前)		育苗箱の 上から 均一に 散布する。		3 回以内 (移植時までの 処理は 1 回以内、 本田では 2 回以内)	
		高密度に は種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50～100g)						
	いもち病 白葉枯病 内穎褐変病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) もみ枯細菌病 紋枯病 イナゴ類 ウカ類 イネトムシ イネトモイムシ イネミスゾウムシ コブノメイカ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤカ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50g	は種時 (覆土前) ～移植当日					
		高密度に は種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50～100g)						
	疑似紋枯症 (褐色菌核病菌) 疑似紋枯症 (褐色紋枯病菌) 疑似紋枯症 (赤色菌核病菌) カメムシ類 イネカラハエ イネヒメモグリハエ ケラ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50g	移植当日					
		高密度に は種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50～100g)						

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。